



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ,
КОСТРОМСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТЯМ**

600000, г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2
тел/факс 8 (4922) 77-16-90
E-mail: rshn8@fsvps.gov.ru
<http://33.fsvps.ru>

№ 11.09.2023 № *ЗФРС-И-2* /5243
На № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

О направлении информации

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям (далее – Управление) информирует Вас о том, что в 2023 году наблюдается резкое обострение эпизоотической ситуации по сибирской язве, случаи возникновения этой опасной болезни, общей для человека и животных, с начала года зарегистрированы в 5 субъектах Российской Федерации (в Чувашской Республике, Тамбовской, Рязанской и Воронежской областях среди крупного рогатого скота и в Республике Тыва у лошади). В 2022 году случаи заболевания антропоозоозом среди крупного рогатого скота регистрировались на территориях Республики Дагестан и Ставропольского края.

Сибирская язва — особо опасная зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку. До 90% всех случаев заболеваний приходится на работников сельского хозяйства и жителей сельской местности, они заражаются в основном при обработке туш.

Возбудитель заболевания - спорообразующая бактерия, способная сохраняться во внешней среде десятилетиями в неактивном состоянии.

Болезнь у животных протекает сверхостро, остро и подостро, а у свиней бессимптомно, в основном в локальной ангинозной форме. Клинические признаки: при молниеносном (сверхостром) течении – длительность болезни от нескольких минут до нескольких часов, при остром течении — животные

Главам администраций
(по списку)

погибают на 2-3-й день болезни, при подостром течении — болезнь продолжается до 7 дней и более, при хроническом течении — продолжается 2-3 месяца. В зависимости от путей заражения выделяют карбункулёзную, кишечную, лёгочную и ангинозную формы сибирской язвы. Без оказания лечебной помощи больное животное погибает. Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено слабо. Из естественных отверстий в организме вытекает кровянистая жидкость.

Заражение человека происходит следующими механизмами и путями передачи:

-контактный — прямой контакт с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животными, при вскрытии их трупов, снятии шкуры и разделке туш;

-аэрогенный — через вдыхание заражённого спорами сибирской язвы воздуха;

-алиментарный — наблюдается при употреблении недостаточно термически обработанной мясной продукции.

Болезнь у человека чаще всего проявляется как инфекция наружных покровов, иногда осложняется сибиреязвенным сепсисом. Вместе с тем может развиваться и первичная генерализованная инфекция, проявляющаяся в лёгочной или кишечной форме. После заражения зоонозом наступает инкубационный период. Его продолжительность — от нескольких часов до 8 сут (в среднем — 2-3 сут). Даже при успешном лечении сибирская язва может повлечь за собой множество осложнений. Например, менингит, набухание головного мозга, отёк лёгких, асфиксию, перитонит, кровотечения в ЖКТ, кишечную непроходимость. Если заболевание успело поразить несколько систем органов, может возникнуть септическая форма и токсический шок.

Сегодня, с появлением новых эффективных антибактериальных препаратов, прогноз для жизни благоприятен. Но уровень здоровья, работоспособности и качество жизни после перенесенного заболевания всегда в той или иной степени снижаются.


При организации мероприятий по предупреждению заноса и распространения бациллы следует обеспечивать:

- ежедневный клинический осмотр в популяциях восприимчивых домашних и диких животных;
- зоогигиенические и ветеринарные требования при перевозках, содержании, кормлении животных;
- убой животных производить только на специализированных бойнях, не допускать подворного убоя;

- карантинировать в течении 30 дней вновь приобретенных животных для проведения ветеринарных исследований и обработок;
- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота, приобретать корма исключительно из благополучных территорий;
- систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
- не приобретать животных, корма и животноводческую продукцию в местах несанкционированной торговли, а также без ветеринарных сопроводительных документов.

Указанная информация направляется для сведения и уведомления заинтересованных организаций и граждан.

Заместитель руководителя Управления



В.В. Московкин